



ПЕРОРАЛЬНА ІМУНІЗАЦІЯ ДИКИХ М'ЯСОЇДНИХ ТВАРИН ВІД СКАЗУ

Пероральна імунізація

здійснюється шляхом
роздавлення
принад із вакциною

- вручну
- авіатранспортом

У зв'язку з воєнним станом
проводиться лише
наземний розподіл



у погодженні з
військовими
адміністраціями

До складу груп входять

- спеціалісти територіальних управлінь Держпродспоживслужби
- спеціалісти органів місцевого самоврядування
- фахівці лісового та мисливського господарств
- користувачі мисливських угідь

Відповідно до
Протиепізоотичного плану на 2023 р.



- на узліссях
- на узбіччі доріг
- біля річок
- на сільськогосподарських угідях
- у лісах
- на перехрестях доріг
- на території вирубок

Вакцина



- **сприяє** створенню імунітету
- **не викликає** захворювання у молодих тварин
- **не сприяє** виділенню вакцинного вірусу зі слиною
- **безпечна** для інших тварин
- **безпечна** для людини та природного середовища
- **стабільна** в польових умовах




Ефективність методу доведена світовим та європейським досвідом,
а також результатами, що були отримані в Україні
після проведення зазначених заходів

Принада

має вигляд невеликих брикетів
із запахом м'ясо-кісткового борошна

5 см



капсула з вакциною



У разі виявлення подібних принад –
не беріть їх руками і не переносять
з місць розкладання, щоб тварини
змогли їх знайти

Сказ домашнього улюбленця можна попередити. ЩОРІЧНА вакцинація – рятує життя!